

EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO ESAVALENTE

Il vaccino esavalente è molto sicuro, ma alcuni bambini possono presentare effetti collaterali.

Reazioni molto comuni al vaccino esavalente

Più di un bambino su 10 dopo il vaccino può presentare:

- dolore, arrossamento e gonfiore al sito di iniezione
- irritabilità e facilità al pianto
- pallore o febbre

Reazioni comuni al vaccino esavalente

Tra uno su 10 e uno su 100 bambini vaccinati può presentare:

- perdita di appetito
- diarrea
- vomito

Reazioni rare al vaccino esavalente

Tra uno su 1.000 e uno su 10.000 bambini vaccinati può presentare:

- convulsioni febbrili
- flaccidità

Reazioni molto rare al vaccino esavalente

Meno di un bambino su 10.000 dopo il vaccino può presentare:

- febbre alta (oltre 40,5 °C)
- pianto inconsolabile o insolitamente acuto

Reazioni estremamente rare al vaccino esavalente

Solo in rarissimi casi (meno di uno su 100.000 casi) un bambino può avere una grave reazione allergica, conosciuta come anafilassi, dopo somministrazione di vaccino esavalente o qualsiasi altro vaccino.

L'anafilassi è una grave condizione medica, ma tutto il personale addetto alle vaccinazioni è addestrato a trattare le reazioni anafilattiche sul posto e con un trattamento immediato il bambino può guarire completamente.

Cosa fare se il vostro bambino ha un effetto collaterale

Come per tutti i vaccini, alcuni bambini possono presentare effetti collaterali, anche se generalmente lievi e passeggeri. La stragrande maggioranza dei bambini non avrà alcun tipo di problema.

Se il vostro bambino sta molto male e/o il malessere è prolungato o se siete preoccupati per qualche motivo in seguito alla sua vaccinazione, non esitate a consultare il vostro medico.

Se il vostro bambino ha convulsioni o qualsiasi problema medico importante una volta tornati a casa dopo la vaccinazione, consultate immediatamente il vostro medico o chiamate un'ambulanza. Le convulsioni febbrili possono preoccupare molto, ma di solito i bambini si riprendono rapidamente.